

自社都合（←の生産量増加等の影響）

用量(7.5g/日, 分包品1包2.5g)

32 ツムラ人参湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-32]

【効能又は効果】
体質虚弱の人、或いは虚弱により体力低下した人の次の諸症：急性・慢性胃腸力タル、胃アトニー症、胃拡張、悪阻(つわり)、萎縮腎

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

33 ツムラ大黃牡丹皮湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-33]

【効能又は効果】
比較的体力があり、下腹部痛があって、便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経困難、便秘、痔疾

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

34 ツムラ白虎加人參湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-34]

【効能又は効果】
のどの渇きとほてりのあるもの

用量(9.0g/日、分包品1包3.0g)

35 ツムラ四逆散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-35]

【効能又は効果】
比較的体力のあるもので、大柴胡湯証と小柴胡湯証との中間証を表わすものの次の諸症：胆嚢炎、胆石症、胃炎、胃酸過多、胃潰瘍、鼻カタル、気管支炎、神経質、ヒステリー

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

36 ツムラ木防已湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-36]

【効能又は効果】
顔色がさえず、咳をともなう呼吸困難があり、心臓下部に緊張圧重感があるものの心臓、あるいは、腎臓にもとづく疾患、浮腫、心臓性喘息

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

37 ツムラ半夏白朮天麻湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-37]

【効能又は効果】
胃腸虚弱で下肢が冷え、めまい、動揺、頭痛、頭痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

38 ツムラ当帰四逆加呉茱萸生薑湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-38]

【効能又は効果】
手足の冷えを感じ、下肢が冷えると下肢又は下腹部が痛くなり易いものの次の諸症：しもやけ、頭痛、下腹部痛、腰痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

39 ツムラ苓桂朮甘湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-39]

【効能又は効果】
めまい、ふらつきがある、または動揺があるものの次の諸症：神経質、ノイローゼ、めまい、動揺、頭切れ、頭痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

40 ツムラ猪苓湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-40]

【効能又は効果】
尿量減少、小便難、口渴を訴えるものの次の諸症：尿道炎、腎臓炎、腎石症、淋炎、排尿痛、血尿、腰以下の浮腫、残尿感、下痢

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

41 ツムラ補中益氣湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-41]

【効能又は効果】
消化機能が衰え、四肢倦怠感著しい虚弱体質者の次の諸症：夏やせ、病後の体力増強、結核症、食欲不振、胃下垂、感冒、痔、脱肛、子宮下垂、陰萎、半身不随、多汗症

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

43 ツムラ六君子湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-43]

【効能又は効果】
胃腸の弱いもので、食欲がなく、みぞおちがつかえ、疲れやすく、貧血性で手足が冷えやすいものの次の諸症：胃炎、胃アトニー、胃下垂、消化不良、食欲不振、胃痛、嘔吐

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

45 ツムラ桂枝湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-45]

【効能又は効果】
体力が衰えたときの風邪の初期

供給不安定
→10/3解除

46 ツムラ七物降下湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-46]

【効能又は効果】
身体虚弱の傾向のあるものの次の諸症：
身体虚弱の傾向のあるもの(のぼせ、肩こり、耳なり、頭痛)
高血圧に伴う随伴症状(のぼせ、肩こり、耳なり、頭痛)

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

47 ツムラ釣藤散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-47]

【効能又は効果】
慢性に続く頭痛で中年以降、または高血圧の傾向のあるもの

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

48 ツムラ十全大補湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-48]

【効能又は効果】
病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

50 ツムラ荊芥連翹湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-50]

【効能又は効果】
蓄膿症、慢性鼻炎、慢性扁桃炎、にきび

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

51 ツムラ潤腸湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-51]

【効能又は効果】
便秘

供給不安定
→10/3解除

52 ツムラ薏苡仁湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-52]

【効能又は効果】
関節痛、筋肉痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

53 ツムラ疎経活血湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-53]

【効能又は効果】
関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

54 ツムラ抑肝散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-54]

【効能又は効果】
虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：
神経症、不眠症、小児夜なき、小児疳症

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

55 ツムラ麻杏甘石湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-55]

【効能又は効果】
小児ぜんそく、気管支炎

供給不安定
→10/3解除

56 ツムラ五淋散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-56]

【効能又は効果】
頻尿、排尿痛、残尿感

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

57 ツムラ温清飲
エキス顆粒 (医療用) [TJ-57]

【効能又は効果】
皮膚の色つやが悪く、のぼせるものに用いる：
月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

58 ツムラ清上防風湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-58]

【効能又は効果】
にきび

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

59 ツムラ治頭瘡一方
エキス顆粒 (医療用) [TJ-59]

【効能又は効果】
湿疹、くさ、乳幼児の湿疹

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

60 ツムラ桂枝加芍薬湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-60]

【効能又は効果】
腹部膨満感のある次の諸症：しぶり腹、腹痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

61 ツムラ桃核承気湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-61]

【効能又は効果】
比較的体力があり、のぼせて便秘しがちなものの次の諸症：
月経不順、月経困難症、月経時や産後の精神不安、腰痛、便秘、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

62 ツムラ防風通聖散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-62]

【効能又は効果】
腹部に皮下脂肪が多量に蓄積し、便秘しがちなもの、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)、肥満症、むくみ、便秘

供給不安定
→10/3解除

63 ツムラ五積散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-63]

【効能又は効果】
慢性に経過し、症状の激しくない次の諸症：
胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、感冒

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

64 ツムラ炙甘草湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-64]

【効能又は効果】
体力がおとろえて、疲れやすいものの動悸、息切れ

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(9.0g/日、分包品1包3.0g)

65 ツムラ帰脾湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-65]

【効能又は効果】
虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：貧血、不眠症

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

66 ツムラ参蘇飲
エキス顆粒 (医療用) [TJ-66]

【効能又は効果】
感冒、せき

供給不安定
→11/4解除

67 ツムラ女神散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-67]

【効能又は効果】
のぼせとめまいのあるものの次の諸症：
産前産後の神経症、月経不順、血の道症

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

68 ツムラ芍薬甘草湯
エキス顆粒 (医療用) [TJ-68]

【効能又は効果】
急激におこる筋肉のけいれんを伴う疼痛、
筋肉・関節痛、胃痛、腹痛

【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

69 ツムラ茯苓飲
エキス顆粒 (医療用) [TJ-69]

【効能又は効果】
吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症：
胃炎、胃アトニー、溜飲

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

70 ツムラ香蘇散
エキス顆粒 (医療用) [TJ-70]

【効能又は効果】
胃腸虚弱で神経質の人の風邪の初期

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)

71
ツムラ四物湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-71)
効能又は効果
皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：産後あるいは流産後の疲労回復、月経不順、冷え症、しもやけ、しみ、血の道症
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

72
ツムラ甘麦大棗湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-72)
効能又は効果
夜泣き、ひきつけ
【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

73
ツムラ柴陥湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-73)
効能又は効果
咳、咳による胸痛

74
ツムラ調胃承気湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-74)
効能又は効果
便秘
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

75
ツムラ四君子湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-75)
効能又は効果
やせて顔色が悪くて、食欲がなく、つかれやすいものの次の諸症：胃腸虚弱、慢性胃炎、胃のもたれ、嘔吐、下痢
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

76
ツムラ竜胆瀉肝湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-76)
効能又は効果
比較体力があり、下腹部筋肉が緊張する傾向があるものの次の諸症：排尿痛、残尿感、尿の濁り、こしけ
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

77
ツムラ芍帰膠艾湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-77)
効能又は効果
痔出血
【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(9.0g/日、分包装1包3.0g)

78
ツムラ麻杏薤甘湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-78)
効能又は効果
関節痛、神経痛、筋肉痛
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

79
ツムラ平胃散
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-79)
効能又は効果
胃がもたれて消化不良の傾向のある次の諸症：急・慢性胃カタル、胃アトニー、消化不良、食欲不振
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

80
ツムラ柴胡清肝湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-80)
効能又は効果
かんの強い傾向のある小児の次の諸症：神経症、慢性扁桃腺炎、湿疹
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

81
ツムラ二陳湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-81)
効能又は効果
悪心、嘔吐
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

82
ツムラ桂枝人参湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-82)
効能又は効果
胃腸の弱い人の次の諸症：頭痛、動悸、慢性胃腸炎、胃アトニー
【禁忌】(5ページ⑧参照) 用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

83
ツムラ抑肝散加陳皮半夏
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-83)
効能又は効果
虚弱な体質で神経がたかぶるものの次の諸症：神経症、不眠症、小児夜尿症、小児疳症
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

84
ツムラ大黃甘甘草湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-84)
効能又は効果
便秘症
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

85
ツムラ神秘湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-85)
効能又は効果
小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

86
ツムラ当帰飲子
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-86)
効能又は効果
冷え症のものの次の諸症：慢性湿疹(分泌物の少ないもの)、かゆみ
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

87
ツムラ六味丸
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-87)
効能又は効果
疲れやすくて尿量減少または多尿、口渇があるものの次の諸症：排尿痛、頻尿、むくみ、かゆみ
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

88
ツムラ二朮湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-88)
効能又は効果
五十肩
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

89
ツムラ治打撲一方
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-89)
効能又は効果
打撲によるはれ及び痛み
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

90
ツムラ清肺湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-90)
効能又は効果
痰の多く出る咳
用量(9.0g/日、分包装1包3.0g)

91
ツムラ竹茹温胆湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-91)
効能又は効果
インフルエンザ、風邪、肺炎などの回復期に熱が長びいたり、また平熱になっても、気分がさっぱりせず、せきや痰が多くて安眠が出来ないもの
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

92
ツムラ滋陰至宝湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-92)
効能又は効果
虚弱なものの慢性のせき・たん
用量(9.0g/日、分包装1包3.0g)

93
ツムラ滋陰降火湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-93)
効能又は効果
のどにうるおいがなく痰の出なくて咳こむもの
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

95
ツムラ五虎湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-95)
効能又は効果
せき、気管支ぜんそく
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

96
ツムラ柴朴湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-96)
効能又は効果
気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：小児ぜんそく、気管支ぜんそく、気管支炎、せき、不安神経症
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

97
ツムラ大防風湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-97)
効能又は効果
関節がはれて痛み、麻痺、強直して屈伸しがたいものの次の諸症：下肢の関節リウマチ、慢性関節炎、痛風
用量(10.5g/日、分包装1包3.5g)

98
ツムラ黄耆建中湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-98)
効能又は効果
身体虚弱で疲労しやすいものの次の諸症：虚弱体質、病後の衰弱、ねあせ
用量(18.0g/日、分包装2包(1包3.0g))

99
ツムラ小建中湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-99)
効能又は効果
体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいずれかを伴う次の諸症：小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき
用量(15.0g/日、分包装2包(1包2.5g))

100
ツムラ大建中湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-100)
効能又は効果
腹が冷えて痛み、腹部膨満感のあるもの
用量(15.0g/日、分包装2包(1包2.5g))

101
ツムラ升麻葛根湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-101)
効能又は効果
感冒の初期、皮膚炎
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

102
ツムラ当帰湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-102)
効能又は効果
背中に寒冷を覚え、腹部膨満感や腹痛のあるもの
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

103
ツムラ酸棗仁湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-103)
効能又は効果
心身がつかれ弱って眠れないもの
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

104
ツムラ辛夷清肺湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-104)
効能又は効果
鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

105
ツムラ通導散
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-105)
効能又は効果
比較体力があり下腹部に圧痛があって便秘しがちなものの次の諸症：月経不順、月経痛、更年期障害、腰痛、便秘、打ち身(打撲)、高血圧の随伴症状(頭痛、めまい、肩こり)
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

106
ツムラ温経湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-106)
効能又は効果
手足がほてり、唇がかわくものの次の諸症：月経不順、月経困難、こしけ、更年期障害、不眠、神経症、湿疹、足腰の冷え、しもやけ
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

107
ツムラ牛車腎気丸
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-107)
効能又は効果
疲れやすくて、四肢が冷えて多尿または多尿で時に口渇がある次の諸症：下痢、腹痛、しびれ、老人のかすみ目、かぜ、頻尿、頻尿、頻尿、むくみ
用量(7.5g/日、分包装1包2.5g)

108
ツムラ人參養栄湯
エキス顆粒 (医療用)
(TJ-108)
効能又は効果
病後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
用量(9.0g/日、分包装1包3.0g)

[illegible]

111

ツムラ清心蓮子飲

エキス顆粒 (医療用)

[TJ-111]

【効能又は効果】

全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの次の諸症：残尿感、頻尿、排尿痛

用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)



112

チョー レイ トウ ゴウ シ モツ トウ
ツムラ猪苓湯合四物湯
 エキス顆粒 (医療用)

[TJ-112]

効能又は効果

皮膚が乾燥し、色つやの悪い体質で胃腸障害のない人の次の諸症：
 排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)

113

サン オウ ショ シン トウ

ツムラ三黄瀉心湯

エキス顆粒 (医療用)

〔TJ-113〕

効能又は効果

比較的体力があり、のぼせ気味で、顔面紅潮し、精神不安で、便秘の傾向のあるものの次の諸症：
 高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）、鼻血、痔出血、便秘、更年期障害、
 血の道症

用量（7.5g／日、分包品1包2.5g）



サイ レイ トウ

ツムラ柴苓湯

エキス顆粒 (医療用)

(TJ-114)

効能又は効果

吐き気、食欲不振、のどのかわき、排尿が少ないなどの次の諸症：

水瀉性下痢、急性胃腸炎、暑気あたり、むくみ

用量(9.0g／日、分包品1包3.0g)

115

イ レ イ ト ウ
ツムラ胃苓湯

エキス顆粒(医療用)

[TJ-115]

効能又は効果

水瀉性の下痢、嘔吐があり、口渴、尿量減少を伴う次の諸症：

食あたり、暑気あたり、冷え腹、急性胃腸炎、腹痛

用量(7.5g／日、分包品1包2.5g)

116

ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯

エキス顆粒 (医療用)

〔TJ-116〕

効能又は効果

気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症：
 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)



117

イン チン ギョ レイ サン

ツムラ茵陳五苓散

エキス顆粒 (医療用)

[TJ-117]

効能又は効果

のどが渇いて、尿が少ないものの次の諸症：
 嘔吐、じんましん、二日酔のむかつき、むくみ
用量(7.5g/日、分包品1包2.5g)



118

リョウ キョウ ジョツ カン トウ

ツムラ 苓姜朮甘湯

エキス顆粒 (医療用)

〔TJ-118〕

効能又は効果

腰に冷えと痛みがあって、尿量が多い次の諸症：
腰痛、腰の冷え、夜尿症

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)

119

ツムラ 苓甘姜味辛夏仁湯

エキス顆粒 (医療用)

〔TJ-119〕

効能又は効果

貧血、冷え症で喘鳴を伴う喀痰の多い咳嗽があるもの。
気管支炎、気管支喘息、心臓衰弱、腎臓病

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)



ツムラ黄連湯
エキス顆粒 (医療用)

オウ レントウ

[TJ-120]

効能又は効果

胃部の停滞感や重圧感、食欲不振のあるものの次の諸症：
急性胃炎、二日酔、口内炎

【禁忌】5(ベジD参照) **用量** (7.5g/日、分包品1包2.5g)



サン モツ オウゴン トウ

ツムラ三物黄芩湯

エキス顆粒 (医療用)

〔TJ-121〕

効能又は効果

手足のほてり

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)



ハイ ノウ サン キョウ トウ

ツムラ排膿散及湯

エキス顆粒 (医療用)

[TJ-122]

【効能又は効果】

患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍、
瘡、面疔、その他癰腫症

【禁忌】 (5ページ⑧参照) **用量** (7.5g/日、分包品1包2.5g)



ツムラ
エキス顆粒 (医療用)

トウ、キ、ケン、チュウ、トウ

ツムラ当帰建中湯

〔TJ-123〕

効能又は効果

疲労しやすく、血色のすぐれないものの次の諸症：
月経痛、下腹部痛、痔、脱肛の痛み

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)



124

セン キョウ チャ テウ サン

ツムラ川芎茶調散

エキス顆粒 (医療用)

〔TJ-124〕

効能又は効果

かぜ、血の道症、頭痛

用量 (7.5g／日、分包品1包2.5g)

125

ツムラ桂枝茯苓丸加薏苡仁

ケイ シ ブク リョウ ガン カ ヨク イ ニン

エキス顆粒 (医療用)

[TJ-125]

効能又は効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：
月経不順、血の道症、にきび、しみ、手足のあれ

用量 (7.5g / 日、分包品1包2.5g)

マ シ ニン ガン
ツムラ 麻子仁丸

エキス製剤 (医療用)

効能又は効果
便秘

供給不安定

用 27.5g / 日, 分包品1包2.5g

127

マ オウ ブ シ サイ シン トウ

ツムラ 麻黄附子細辛湯

エキス顆粒 (医療用)

〔TJ-127〕

効能又は効果

悪寒、微熱、全身倦怠、低血圧で頭痛、めまいあり、四肢に疼痛冷感あるもの次の諸症：感冒、気管支炎

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)

ツムラ啓脾湯 ケイ ヒ トウ

エキス顆粒（医療用） [TJ-129]

効能又は効果
やせて、顔色が悪く、
ものの次の諸症：
胃腸虚弱、慢性胃腸炎、食欲不振、下痢の傾向がある。

供給不安定

（小瓶1包2.5g）



ダイ ジョウ キ トウ

ツムラ大承気湯

エキス顆粒 (医療用)

[TJ-133]

効能又は効果

腹部がかたくつづかえて、便秘するもの、あるいは肥満
 体質で便秘するもの。
 常習便秘、急性便秘、高血圧、神経症、食当り

用量 (7.5g / 日、分包品1包2.5g)



134

ケイ シ カ シヤク ヤク ダイ オウ トウ

ツムラ桂枝加芍薬大黃湯

エキス顆粒（医療用）

〔TJ-134〕

効能又は効果

比較的体力のない人で、腹部膨満し、腸内の停滞感あるいは腹痛などを伴うものの次の諸症：

1. 急性腸炎、大腸カタル
2. 常習便秘、宿便、しぶり腹

用量（7.5g／日、分包品1包2.5g）



135

イン シン コウ トウ

ツムラ茵陳蒿湯

エキス顆粒 (医療用)

[TJ-135]

効能又は効果

尿量減少、やゝ便秘がちで比較的体力のあるものの次の諸症：

黄疸、肝硬変症、ネフローゼ、じんましん、口内炎

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)

136 ツムラ清暑益気湯
セイ ショ エツ キ トウ
エキス顆粒(薬用)

効能又は効果
 暑気あたり、暑さによる食欲不振、下痢、嘔吐、頭痛、倦怠感、めまい、腰痛、手足のしびれ、手足の冷え、肩こり、首の痛み、手足のむくみ、手足の乾燥、皮膚のかゆみ、アレルギー性鼻炎、花粉症、喘息、気管支炎、肺気腫、慢性閉塞性肺疾患、心臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満、うつ病、不安障害、神経痛、坐骨神経痛、変形性関節症、骨粗鬆症、更年期障害、月経不調、子宮内膜症、卵巣機能低下症、高齢者の認知機能低下症、小児の学習障害、発達障害、ADHD、自閉スペクトラム症、知的障害、精神遅滞、統合失調症、双極性障害、気分障害、強迫性障害、恐怖症、摂食障害、アルコール依存症、薬物依存症、たばこの依存症、ニコチン離脱症候群、禁煙補助剤としての使用、がん治療に伴う副作用の軽減、緩和ケアとしての利用、在宅医療での活用、介護施設での利用、高齢者福祉施設での利用、地域包括ケアシステムの実現に貢献する。

供給不安定 ⇒10/3解

137

ツムラ^{ガミ}加味帰脾湯
エクス顆粒 (医療用)

(TJ-137)

効能又は効果

虚弱体質で血色の悪い人の次の諸症：
貧血、不眠症、精神不安、神経症

用量 (7.5g/日、分包品1包2.5g)



ツムラ桔梗湯
エキス顆粒（薬用）

キョウトウ

供給不安定

【禁忌】（5ページ⑧参照）

501

ツムラ紫雲膏

(TJ-501)

効能又は効果

火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷

用法及び用量

外用
患部を清潔にしたのち、1日数回適量を直接患部に塗布、あるいはガーゼにのびて貼付する。

【禁忌】（5ページ③参照）

3020 ツムラの生薬コウジン末(調剤用)
[TJ-3020]
効能又は効果 用法及び用量
漢方処方の調剤に用いる。

3023 (創) **日本薬局方ブシ末 ブシ末(調剤用)「ツムラ」**
[TJ-3023]
【効能又は効果】 【用法及び用量】
 漢方処方調剤に用いる。

【用法及び用量】
通常、成人1日7.5gを2～3回に分け、食前又は食間に経口投与する。
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。
該当製品 下記以外の処方 115品目
■分包品 1包あたりのg数：2.5g

● 次の品目については、用法及び用量が異なる。

通常、成人1日9.0gを2～3回に分割 該当製品(番号) TJ-19、29、34、64、77、90、92、108、114 9品目 ■ 分包品 1包あたりのg数：3.0g	
通常、成人1日18.0gを2～3回に分割 該当製品 TJ-98 ツムラ黄耆建中湯 ■ 分包品 1包あたりのg数：3.0g	

通常、成人1日15.0gを2～3回に分割 該当製品 TJ-99 ツムラ小建中湯 TJ-100 ツムラ大建中湯 ■ 分包品 1包あたりのg数：2.5g	
---	---

※組成、用法及び用量、「警告・禁忌を含む使用上の注意」等は製品添付文書をご覧ください。5～6ページには「警告」、「禁忌」、相互作用、副作用(重大な副作用、その他の副作用)を一覧表にして掲載しております。